

Наименование направляющего учреждения				Код направляющего учреждения			
Фамилия пациента*				Имя пациента*			
Отчество пациента*				Дата рождения пациента*			
Контактный телефон пациента <input type="checkbox"/> ; врача <input type="checkbox"/>		Пол пациента	Беременность	Срок беременности		Время взятия образца	
		<input checked="" type="checkbox"/> Женский	<input checked="" type="checkbox"/> Да	Неделя		ЧЧ – ММ	
Диагноз				Дата взятия образца			
Фамилия врача				И.О. врача			
				Код пациента			

Внимание! Для выполнения программы требуется доставить все указанные образцы биологического материала одновременно. При взятии крови соблюдайте следующую последовательность заполнения пробирок: 1. Кровь (сыворотка). 2. Кровь с цитратом натрия. 3. Кровь с ЭДТА. 4. Кровь с флюоридом натрия.

ПРОГРАММЫ ОБСЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ		приоритет обычный
Вакуумная пробирка с разделительным гелем	<input type="checkbox"/> 300113 Мониторинг беременности (дополнительные исследования) КРОВЬ (СЫВОРОТКА) ТТГ, Железо	<input type="checkbox"/> 300112 Урогенитальные инфекции у беременных (расширенное обследование) СОСКОБ/ОТДЕЛЯЕМОЕ из ВЛАГАЛИЩА Флороценоз (кол.) и NCMT (кол.) ДНК Candida albicans, ДНК Candida glabrata, ДНК Candida krusei, ДНК Candida parapsilosis, ДНК Candida tropicalis, ДНК Ureaplasma parvum, ДНК Ureaplasma urealyticum, ДНК Mycoplasma hominis, ДНК Gardnerella vaginalis, ДНК Atopobium vaginae, ДНК Enterobacteriaceae, ДНК Staphylococcus spp., ДНК Streptococcus spp., ДНК Lactobacillus spp., ДНК Bacteria spp., ДНК Neisseria gonorrhoeae, ДНК Chlamydia trachomatis, ДНК Mycoplasma genitalium, ДНК Trichomonas vaginalis
Образец № 1 из 3 Вакуумная пробирка с ЭДТА	<input type="checkbox"/> КРОВЬ с ЭДТА Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой без СОЭ	
Образец № 2 из 3 Вакуумная пробирка с флюоридом натрия	<input type="checkbox"/> КРОВЬ с ФЛЮОРИДОМ НАТРИЯ Глюкоза	
«Эппендорф» с транспортной средой розового цвета	<input type="checkbox"/> «Эппендорф» с транспортной средой розового цвета	<input type="checkbox"/> СОСКОБ/ОТДЕЛЯЕМОЕ из ВЛАГАЛИЩА ДНК Herpes simplex virus I/II типа/(кач.), ДНК Cytomegalovirus (кач.), ДНК Streptococcus agalactia (кол.)
Образец № 2 из 3	Образец № 3 из 3	<input type="checkbox"/> МАЗОК/ОТДЕЛЯЕМОЕ из ВЛАГАЛИЩА и ЦЕРВИКАЛЬНОГО КАНАЛА Микроскопическое исследование мазка из влагалища (V) и цервикального канала (C)

Вакуумная пробирка ЭДТА с гелем (фиолетовая крышка с жёлтым кольцом)	НЕИНВАЗИВНАЯ ДИАГНОСТИКА	приоритет обычный	КРОВЬ с ЭДТА
<input type="checkbox"/> 180045 Определение резус-фактора плода (выявление гена RHD плода в крови матери)	Внимание! Центрифугировать пробирку не позднее двух часов после взятия, рекомендуемые параметры: 2000 g – 10 минут при T = +18+25 °C. Хранить при T = +2 +8 °C в первичной пробирке, доставить в течение 12 часов.		

Внимание! На направительном бланке указаны преаналитические требования с условиями хранения образцов до 24 часов, подробнее в Приложении №2. Для всех образцов кровь (сыворотка) рекомендуется центрифугировать пробирку после формирования фибринового сгустка, но не позднее двух часов после взятия крови (2000 g – 10 минут при T = +18+25 °C). Хранить при T = +2 +8 °C в первичной пробирке.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАКАЗАННЫХ АНАЛИЗОВ

Бланк заказа заполняется только печатными буквами черной или синей ручкой!

 Выбрать
 Отменить

ZQ05

ПРОГРАММЫ ОБСЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ		приоритет обычный
Вакуумная пробирка с разделительным гелем ШТРИХКОД ПРОБЫ Образец № 1 из 7	<input type="checkbox"/> 300109* Лабораторное обследование беременных в I, III триместре и при постановке на учет на любом сроке	КРОВЬ (СЫВОРОТКА) anti-Treponema pallidum сумм. (кач.), HBsAg (кач.), anti-HCV сумм. (кач.), anti-HIV 1,2/Ag p24 (кач.)
Вакуумная пробирка с разделительным гелем ШТРИХКОД ПРОБЫ Образец № 2 из 7	<input type="checkbox"/>	КРОВЬ (СЫВОРОТКА) Общий белок, Мочевина, Креатинин, Билирубин общий, Билирубин прямой, Билирубин непрямо́й (неконъюгированный), АЛТ, АСТ, anti-Rubella virus IgG (кол.), anti-Rubella virus IgM (кач.), anti-Toxo gondii IgG (кол.), anti-Toxo gondii IgM (кач.)
Вакуумная пробирка с цитратом натрия ШТРИХКОД ПРОБЫ Образец № 3 из 7	<input type="checkbox"/>	ЗАМОРОЖЕННАЯ ПЛАЗМА** (ЦИТРАТ НАТРИЯ) АЧТВ, Фибриноген, Протромбин+МНО
Вакуумная пробирка с ЭДТА ШТРИХКОД ПРОБЫ Образец № 4 из 7	<input type="checkbox"/>	КРОВЬ с ЭДТА Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой без СОЭ, группа крови + Rh фактор
Вакуумная пробирка с флюоридом натрия ШТРИХКОД ПРОБЫ Образец № 5 из 7	<input type="checkbox"/>	КРОВЬ с ФЛЮОРИДОМ НАТРИЯ Глюкоза
Вакуумная пробирка со стабилизатором ШТРИХКОД ПРОБЫ Образец № 6 из 7	<input type="checkbox"/>	МОЧА Общий анализ мочи
Стекло ШТРИХКОД ПРОБЫ Образец № 7 из 7	<input type="checkbox"/>	МАЗОК/ОТДЕЛЯЕМОЕ из ВЛАГАЛИЩА и ЦЕРВИКАЛЬНОГО КАНАЛА Микроскопическое исследование мазка из влагалища (V) и цервикального канала (С)

Анонимно Не анонимно (Конфиденциально)

Адрес пациента*
Страна

Республика, край, область, автономный округ

Район

Город, поселок

Улица

Дом Корп. Стр. Кв.

Коды контингента – обязательно для заполнения при обследовании на ВИЧ-инфекцию:

- 101 Обследованные добровольно по инициативе пациента (при отсутствии других причин обследования)
- 102 Лица, употребляющие психоактивные вещества
- 103 Мужчины, имеющие секс с мужчинами
- 104 Лица с подозрением или подтверждённым диагнозом инфекций, передаваемых половым путём
- 109 Беременные
- 110 Мужья, половые партнёры женщин, поставленных на учёт по беременности
- 111 Лица, при призыве на военную службу, поступающие на военную службу (приравненную службу) по контракту, поступающие в военно-учебные заведения
- 112 Лица, находящиеся в местах лишения свободы
- 115 Медицинский и иной персонал, работающий с больными ВИЧ-инфекцией или инфицированным материалом
- 117 Лица с подозрением или подтверждённым диагнозом гепатита В или гепатита С
- 118 Прочие
- 200 Иностранцы граждане и лица без гражданства

Должность лица, направляющего биоматериал на исследование

ФИО, направляющего биоматериал на исследование

Подпись лица, направляющего биоматериал на исследование

Внимание! На направительном бланке указаны преаналитические требования с условиями хранения образцов до 24 часов, подробнее в Приложении №2.
Для всех образцов кровь (сыворотка) рекомендуется **центрифугировать** пробирку после формирования фибринового сгустка, но **не позднее двух часов** после взятия крови (2000 г – 10 минут при T=+18+25 °С). Хранить при T=+2 +8 °С в первичной пробирке.

* Немедленно центрифугировать пробирку (2000 г – 10 минут при T=+18+25 °С), перенести всю плазму в пробирку с крышкой-пробкой (без наполнителя) и сразу заморозить при T= -20 °С. Минимальный объем полученной плазмы 1 мл. Доставить в замороженном виде.

* При конфиденциальном обследовании на ВИЧ-инфекцию все поля обязательны для заполнения, информация вносится с документа, удостоверяющего личность. При нарушении требований заполнения направительного бланка, результат исследования на ВИЧ-инфекцию будет анонимным.

Требования к заполнению направительного бланка определены СП 3.3686-21 "Профилактика ВИЧ-инфекции"

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЗАКАЗАННЫХ АНАЛИЗОВ

Бланк заказа заполняется только печатными буквами
черной или синей ручкой!

Выбрать
 Отменить

ZQ05